

## Vážený paciente, vážení rodiče!

Přečtěte si pozorně následující příbalovou informaci, neboť obsahuje důležité informace, které byste měli vědět, pokud používáte tento zdravotnický prostředek. Pokud máte dotazy, prosím kontaktujte Vašeho lékaře nebo lékárníka.

### Příbalová informace

# INFECTODELL®

## Roztok pro aplikaci na pokožku u Molluscum contagiosum

### Složení

1 ml prostředku InfectoDell obsahuje 50 mg hydroxidu draselného.

Další složky: čistěná voda

1 balení obsahuje 10 ml roztoku pro aplikaci na pokožku a přídatný uzávěr s plastovou špátlí pro nanášení roztoku.

### Co je InfectoDell a k čemu se používá?

InfectoDell se používá zevně na pokožku proti Molluscum contagiosum, kožnímu onemocnění způsobené virem.

InfectoDell způsobuje likvidaci buněk nakažených virem a tímto dochází k obranné reakci kůže v oblasti postižené molluskem. Cílem léčby je bezbolestný zánět na malé ploše. Jakmile se zhojí, dojde ke zhojení a odstranění papilárních výrůstků.

*Prosím pozor!* InfectoDell není vhodný pro léčbu běžných bradavic (Verrucae). Pokud si nejste jisti, jestli Vy nebo Vaše dítě jste postiženi Molluscum contagiosum nebo běžnými bradavicemi, měli byste kontaktovat svého lékaře dříve, než se rozhodnete použít InfectoDell.

### Jak se InfectoDell používá

Vždy používejte InfectoDell přesně podle instrukcí v příbalové informaci. Pokud si nejste jisti, poraďte se svým lékařem nebo lékárníkem.

### Dávkování

Dvakrát denně použijte špátlí pro nanášení malého množství prostředku InfectoDell přímo na Molluscum a nechte roztok zaschnout.

### Jak se InfectoDell správně používá

#### 1. Co udělat před prvním použitím

- Vyměňte uzávěr lahvičky za uzávěr s plastovou špátlí. Není třeba si uschovat uzávěr bez špátle.
- Poznamenejte si datum prvního použití do místa na obalu, které je pro to určené. Po prvním otevření je InfectoDell použitelný po dobu 4 týdnů.
- Při každém použití si zajistěte velmi dobré osvětlení.


#### 2. Namočte špátli v prostředku InfectoDell

- Vždy umístěte InfectoDell na rovný, pevný povrch.
- Otevřete bezpečnostní uzávěr opatřený dětskou pojistkou (stlačením a současným otočením doleva). Pečlivě oťete špátli namočenou v prostředku InfectoDell na vnitřní straně otvoru lahvičky. Na špátli nesmí být vidět ani kapka.



#### 3. Naneste na Molluscum contagiosum

- Jemně naneste na všechny mollusca plochou stranou špátle a nechte zaschnout. Po 3 až 5 nanásech je nutné špátli opět namočit v prostředku InfectoDell.
- Po použití opět zasuňte lahvičku uzávěrem se špátlí.
- Vždy uchovávejte InfectoDell důkladně uzavřený ve vzpřímené poloze, mimo dosah a dohled dětí.



#### 4. Používejte denně

- Nanášejte InfectoDell jak je popsáno v bodě 2 a 3 **dvakrát denně**; nejvhodnější je ráno a večer.

### Možné nežádoucí účinky

InfectoDell je (pokud se používá dle návodu) dobře snášen. Jako všechny přípravky pro léčbu nemocí, může i InfectoDell způsobit nežádoucí účinky.

**Běžné:** Krátkodobé kožní podráždění, mimořádné zarudnutí a mírné pálení v místě aplikace. Objevují se okamžitě po nanášení prostředku InfectoDell a odezní po několika minutách. Intenzita kožního podráždění je závislá na citlivosti pokožky a množství nanášeného prostředku. Proto bedlivě sledujte instrukce pro použití a nanášejte InfectoDell opatrně. Přechodná zánětlivá reakce se zarudnutím a svěděním v místě výskytu mollusců je záměrná a vede k jejich vyléčení. Hojící se pokožka se může pokrýt i strupem.

**Méně časté:** Přechodné změny kožní pigmentace.

**Vzácné:** Tvorba jizev. Riziko vzniku jizev je větší, pokud jsou ranky škrábány nebo mačkány.

Pokud zaznamenáte nežádoucí účinky, které nejsou zaznamenány v této příbalové informaci, informujte o tom svého lékaře. Pokud je třeba, lékař rozhodne o dalších opatřeních.

### Jak Molluscum contagiosum vypadá?

Molluscum contagiosum jsou kulaté vyvýšeniny nebo papulky, které jsou v průměru velké 2-5 mm. Vyskytují se na povrchu kůže a obvykle se vyskytují ve sliznicích. Mají barvu pokožky nebo jsou načervenalé s lesklým nebo perleťovým povrchem. Obvykle mají vkleslý střed (dólik nebo jamka), kde se může objevit malý otvor.

### Než použijete InfectoDell

InfectoDell se nesmí používat:

- v blízkosti očí
- u již zanícených mollusků
- na sliznice (ústa nebo oblast genitálií), na otevřené rány nebo pokožku, která je poraněna od škrábání
- pro léčbu běžných bradavic, stařeckých bradavic, mateřských znamének, kuřích ok nebo jiných mozočků
- u dětí mladších 2 let
- když je známá tendence k vytváření nadměrných jizev (hypertrofické, koloidní jizvy)
- u osob s vrozenou nebo získanou nedostatečností imunitního systému (např. HIV infekce nebo léčba přípravky potlačujícími imunitní systém), neboť s léčbou těchto osob není dostatek zkušeností

### Buďte opatrní při používání prostředku InfectoDell


- Vyvarujte se kontaktu dítěte s Vaší léčenou pokožkou při kojení,
- u pacientů atopickou dermatitidou (atopický ekzém). InfectoDell by se neměl používat v akutní fázi atopické dermatitidy, ale až po předchozí léčbě doporučené lékařem.

### Užívání jiných léčivých přípravků

Doposud nejsou známy interakce s jinými léčivými přípravky. Pro jistotu však neaplikujte InfectoDell na stejné místo pokožky s jiným léčivým přípravkem.


### 5. Konec používání

- Ukončete aplikaci, jakmile se objeví známky zánětu (začíná tím proces hojení). Počátek zánětu lze rozpoznat podle zarudnutí, které trvá nejméně 12 hodin.
- Nepoužívejte prostředek déle než 14 dní, i když se zánět do té doby neobjeví. V tomto případě se poraďte se svým lékařem. On rozhodne o dalším postupu.



### 6. Vyčkejte na zhojení mollusků

- Zánět značí, že Vaše tělo bojuje s molluskem. Je třeba být trpělivý a vyčkat do zhojení. InfectoDell se nesmí používat na zanícené papulky.



### Důležité informace k bezpečnému používání

- InfectoDell obsahuje hydroxid draselný (žiravinu) a může působit agresivně, pokud je nesprávně používán.
- Vyhněte se všem kontaktům s očima! Po každém použití si umyjte ruce. Pokud je náhodně zanesen InfectoDell do očí, okamžitě je vypláchněte velkým množstvím vody. Ihned kontaktujte lékaře a ukažte mu tuto příbalovou informaci.
- Zabezpečte, aby se roztok nedostal do kontaktu se zdravou pokožkou nebo sliznicemi, aby se předešlo podráždění. Pokud kontakt nastal, ihned omýjte zasažené místo velkým množstvím vody. Po použití vždy nechte roztok důkladně zaschnout, aby se předešlo přenosu na zdravou pokožku.
- V případě předávkování nebo příliš častého použití se může objevit bolestivý zánět kůže. Proto dodržujte výše uvedené doporučení.
- Zamezte kontaktu roztoku s oblečením, textiliemi nebo ubrusem. Pokud dojde ke kontaktu, odstraňte rozlitý InfectoDell savým papírovým ubruskem a ihned vyperte postižené místo velkým množstvím vody.

### Jak InfectoDell uchovávat

Uchovávejte InfectoDell mimo dosah a dohled dětí.

Skladujte lahvičku důkladně uzavřenou ve vzpřímené poloze za obvyčné teploty.

Po prvním otevření je roztok použitelný po dobu 4 týdnů. Zaznamenejte si datum otevření lahvičky na obal prostředku.

Datum použitelnosti je uveden na obalu prostředku a na lahvičce. Nepoužívejte zdravotnický prostředek po uplynutí doby použitelnosti.

### Výrobce:

InfectoPharm Arzneimittel und Consilium GmbH  
Von-Humboldt-Str. 1, D-64646 Heppenheim, Německo

### Dovozce pro ČR:

R-MARK s.r.o.  
Starodvorská 13, 165 00 Praha 6

**Datum revize této příbalové informace:** prosinec 2007



14021/401-G